

# 令和5年度 高冷地水稻生育速報(第1報)

岐阜県中山間農業研究所

## 1. 生育概況(6月1日調査)

調査日	年度	草丈 (cm)		茎数 (本/m <sup>2</sup> )		葉色				葉齢	
						葉色板		SPAD値			
たかやまもち	本年	25.7	(106%)	118	(72%)	3.5	(+0.2)	32.6	(+1.0)	4.9	(-0.1)
	前年	22.8		131		3.2		31.7		4.8	
	平年	24.2		164		3.3		31.6		5.0	
あきたこまち	本年	23.0	(104%)	140	(92%)	3.6	(+0.2)	33.1	(+1.8)	4.9	(-0.1)
	前年	21.2		131		3.5		33.1		5.2	
	平年	22.2		152		3.4		31.3		5.0	
ひだほまれ	本年	24.9	(106%)	133	(86%)	3.5	(+0.3)	33.1	(+1.4)	5.2	(+0.1)
	前年	22.3		140		3.2		32.9		5.3	
	平年	23.6		155		3.2		31.7		5.1	
ひとめぼれ	本年	21.7	(100%)	144	(74%)	3.8	(+0.4)	32.6	(-2.6)	5.1	(-0.1)
	前年	20.0		142		3.3		34.9		5.3	
	平年	21.7		194		3.4		35.2		5.2	
コシヒカリ	本年	24.3	(103%)	133	(76%)	3.5	(+0.2)	31.7	(-1.7)	4.9	(-0.1)
	前年	22.1		133		3.2		32.0		5.1	
	平年	23.7		175		3.3		33.4		5.0	

栽培条件：移植5月16日 栽植密度22.2株/m<sup>2</sup> 1株4本稚苗移植 基肥N=0.5kg/a

平年値：過去5年間(H29年～R3年)の平均値

( )内の数値は対平年値

## 2. 気象状況と当面の管理

### 1) 気象概況

移植後の平均気温は平年並みに推移し、日照時間は平年よりやや多かった。

### 2) 生育概況

生育は草丈は平年並み～やや高く、茎数は平年より少ない。SPAD値は「ひとめぼれ」、「コシヒカリ」でやや低い。葉齢は平年並みである。

### 3) 病害虫等の発生状況

イネミズゾウムシ、イネゾウムシの発生が確認された。発生密度の高い無防除のほ場においては発生状況に合わせ防除を検討する。

### 4) 今後の管理

「早期中干し」は生育促進、土壌中のガス抜き及びアオミドロ、藻類対策として効果がある。6月上旬までに行う。