

令和7年度 高冷地水稻生育速報(第5報)

岐阜県中山間農業研究所

1. 生育概況(8月1日調査)

調査日	年度	草 丈 (cm)		茎 数 (本/㎡)		葉 色				葉 齢		出穂期
						葉色板		SPAD値				
たかやまもち	本年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	出穂期:7月22日
	前年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(前年:7月23日)
	平年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(平年:7月23日)
あきたこまち	本年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	出穂期:7月22日
	前年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(前年:7月24日)
	平年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(平年:7月25日)
ひだほまれ	本年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	出穂期:7月26日
	前年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(前年:7月28日)
	平年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(平年:7月29日)
ひとめぼれ	本年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	出穂期:7月30日
	前年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(前年:7月29日)
	平年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(平年:7月30日)
コシヒカリ	本年	103.9	-	460	-	3.8	-	36.6	-	13.0	-	
	前年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(前年:8月1日)
	平年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(平年:8月2日)

栽培条件: 移植5月15日 栽植密度22.2株/㎡ 1株4本稚苗移植 基肥N=0.5kg/a 穂肥N=0.3kg/a

平 年 値 : 過去5年間(R2年~R6年)の平均値
()内の数値は対平年値

2. 気象状況と当面の管理

1)気象概況

7月下旬の平均気温は平年より高く、日照時間は平年より多かった。

2)生育概況

生育は、出穂期は平年より3日早い~平年並みであった。

「コシヒカリ」は8/2頃に出穂期となると思われる。

3)病害虫等の発生状況

斑点米カメムシ類の注意報が発令されており、所内ほ場においても斑点米カメムシが見られる。

4)今後の管理

出穂期は稲が最も水を必要とするする時期であり、出穂後は湛水管理を行う。葉いもち病の発生が見られる圃場は穂いもち病への移行を防ぐため防除を検討する。また、斑点米カメムシ類の注意報が発令されているため、適期に防除を行う。

令和7年(2025年)の気象図




図1 本年度の半旬別気温の推移(高山市)




図2 本年度の半旬別降水量の推移(高山市)




図3 本年度の半旬別日照時間の推移(高山市)

データ: 高山特別地域気象観測所